

Quand utiliser un test Covid rapide

Avoir l'un **des symptômes** suivants :

- Fièvre :
 - À partir de 6 ans : 38,1 °C (100,6 °F) et plus (température buccale)
 - De 6 mois à 5 ans : 38,5 °C (101,3 °F) et plus (température rectale)
- Perte soudaine de l'odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût
- Toux (nouvelle ou aggravée)
- Essoufflement
- Difficulté à respirer
- Mal de gorge

Ou **deux des symptômes** suivants :

- Nez qui coule ou congestion nasale (nez bouché) de cause inconnue
 - Maux de tête
 - Grande fatigue
 - Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique)
 - Perte d'appétit importante
 - Nausées ou vomissements
 - Maux de ventre
 - Diarrhée
- Les personnes qui ont eu la COVID-19 au cours des deux derniers mois n'ont pas à passer de test de dépistage.
 - Les personnes non vaccinées doivent passer un test rapide afin de sortir de leur période d'isolement au jour 5.
- Si le résultat est **positif**, il faut s'isoler au moins **5 jours**. La période d'isolement débute dès l'apparition des symptômes ou, en l'absence de symptômes, à la date du prélèvement.
 - Si le résultat est **négatif**, il est possible de poursuivre ses activités, en respectant les règles d'hygiène. Il est requis de faire un deuxième test rapide 24 à 36 heures plus tard.